

Bayer



SEÑOR:
RODRIGO ASTETE ROCHA
JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
AV. PRESIDENTE BULNES N° 140
SANTIAGO

Bayer S.A.
División CropScience
Av. Andrés Bello N° 2457
Piso 21 Of. 2101,
Providencia
Santiago – Chile
Fono: (56-2) 2520 8200
www.bayercropscience.cl

Santiago, 17 de Julio de 2017.

At: Sra. Alejandra Aburto Prieto, Jefa del Subdepartamento de Viñas y Vinos, Inocuidad y Biotecnología.

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida CALYPSO 480 SC, cuyo ingrediente activo es Tiacloprid, autorización SAG número 1.660 para el control de *Lobesia botrana* en *Prunus salicina* y *Prunus domestica* en Chile.

BAYER S.A certifica que es posible recomendar el uso de insecticida CALYPSO 480 SC, cuyo ingrediente activo es Tiacloprid, Número de autorización SAG 1.660 para el control de *Lobesia botrana*, el cual es efectivo en variedades de ciruelo europeo y ciruelo japonés.

CALYPSO 480 SC para el control de *Lobesia botrana* puede ser aplicado, 2 veces durante la temporada, desde floración hasta Pre cosecha, dependiendo de las restricciones establecidas en la etiqueta del producto y/o los países de destino de la producción.

La concentración de CALYPSO 480 SC para el control de *Lobesia botrana* y período de protección por aplicación se describe a continuación:

Especie	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria convencional	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria bajo volumen	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria electrostática	Período de protección por aplicación (días)
<i>Prunus salicina</i>	25 cc/100 L	No recomienda	No recomienda	14 días
<i>Prunus domestica</i>	25 cc/100 L	No recomienda	No recomienda	14 días

Para lograr la mayor efectividad en el control, considerar que las siguientes condiciones ambientales pueden disminuir la eficacia de CALYPSO 480 SC: No aplicar con temperaturas superiores a los 28°C ni en condiciones de viento superior a 10 km/hr. En caso de lluvias superiores a los 15 mm se recomienda repetir la aplicación, especialmente si éstas ocurren cercano al momento de aplicación.

CALYPSO 480 SC debe ser aplicado en el momento de Inicio de eclosión de larvas, calculado a partir del BIOFIX (Vuelo sostenido de la plaga), dirigiendo la aspersión a flores y racimos para el control de LARVAS de todos los estadios.