

Santiago, 30 de julio de 2018

7698/18

SEÑOR:

RODRIGO ASTETE ROCHA

JEFE DE DIVISIÓN PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

AV. PRESIDENTE BULNES N° 140

SANTIAGO

OF. DE PARTES CENTRAL	
N° :	
02 AGO 2018	
A :	
<input type="checkbox"/> CON ANT.	<input checked="" type="checkbox"/> SIN ANT.

At: Sra. Alejandra Aburto Prieto, Jefa del Subdepartamento de Vinos y Vinos,
Inocuidad y Biotecnología.

Ref: Declaración de eficacia del plaguicida LAMBDA CIHALOTRINA 5 EC AGROSPEC, INGREDIENTE ACTIVO: LAMBDA CIHALOTRINA, FORMULACIÓN: CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC), CONCENTRACIÓN: 5% p/v), NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1789; para el control de *Lobesia botrana* en Ciruelos en Chile.

AGROSPEC S.A. certifica que es posible recomendar el uso de insecticida LAMBDA CIHALOTRINA 5 EC AGROSPEC, NUMERO DE AUTORIZACION SAG 1789, para el control de *Lobesia botrana*, el cual es efectivo en variedades de ciruelos.

LAMBDA CIHALOTRINA 5 EC AGROSPEC para el control de *Lobesia botrana* puede ser aplicado 3 veces durante la temporada, desde fruto recién cuajado hasta precosecha dependiendo de las restricciones en los países de destino de la producción.

La concentración de LAMBDA CIHALOTRINA 5 EC AGROSPEC para el control de *Lobesia botrana* y período de protección por aplicación se describe a continuación:

Tipo de conducción	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria convencional	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria bajo volumen	Concentración cc o gr/100 lt Maquinaria electrostática	Período de protección por aplicación (días)
<i>Prunus salicina</i>	20	No se recomienda	No se recomienda	18
<i>Prunus domestica</i>	20	No se recomienda	No se recomienda	18

Para lograr la mayor efectividad en el control, considerar que las siguientes condiciones ambientales pueden disminuir la eficacia de LAMBDA CIHALOTRINA 5 EC AGROSPEC: no aplicar con vientos excesivos (más de 8 km/hr), no aplicar con t° mayores a 25°C o alta humedad ambiental, en caso de lluvias por sobre los 30 mm, repetir la aplicación.

LAMBDA CIHALOTRINA 5 EC AGROSPEC debe ser aplicado en el momento de máxima eclosión DE HUEVOS dirigiendo la aspersión a los frutos para el control de estado de LARVAS de todos los estados de desarrollo.

Considerar que LAMBDA CIHALOTRINA 5 EC AGROSPEC es altamente tóxico para abejas y no se cuenta con antecedentes que midan toxicidad en enemigos naturales.



LAMBDA CIHALOTRINA, ingrediente activo de LAMBDA CIHALOTRINA 5 EC AGROSPEC, actúa por contacto e ingestión, y su mecanismo de acción está clasificado como un piretroide con buen efecto choque y buena persistencia que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos alterando el flujo de iones a través de la membrana nerviosa.

LAMBDA CIHALOTRINA tiene tolerancia en ciruelos en Chile según se indica en el cuadro siguiente:

Ingrediente activo	Ciruelos (ppm)	Período de Carenia (días)	Fuente
Lambda cihalotrino	0,5 ppm	3 días	Resolución exenta nº 762 de 29 de septiembre de 2011

Para Chile la carencia es de 3 días y el período de reingreso es de 12 horas

Macarena Madariaga P
Gerente de Asuntos Regulatorios
Agrospec S.A.

Ana María Prado
Gerente Técnico
Agrospec S.A.